

Интересные встречи птиц в пойме Нижней Оби (Ямало-Ненецкий автономный округ)

М. Г. Головатин, В. А. Соколов



Головатин Михаил Григорьевич, Соколов Василий Андреевич, Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144; golovatin@ipae.uran.ru; sokol@ipae.uran.ru

Поступила в редакцию 4 октября 2019 г.

Представлены сведения о находках некоторых видов птиц в пойме Нижней Оби в пределах ЯНАО в ходе многолетних исследований этого региона.

Ключевые слова: орнитофауна, распространение, биоразнообразие.

В рамках изучения и мониторинга биоресурсов поймы Нижней Оби начиная с 2003 г. были организованы исследования орнитофауны этой территории в пределах ЯНАО. В 2003–2009 гг. работами была охвачена верхняя часть поймы — до г. Салехарда, где было заложено несколько рабочих площадок. В 2010–2014 гг. рабочие площадки были заложены в нижней части. В 2015–2017 и 2019 гг. пойму Нижней Оби обследовали на всем ее протяжении. Наблюдения вели с катера во время перемещения по крупным рукавам реки и на рабочих площадках, где проводили радиальные лодочные экскурсии по небольшим протокам и пешие экскурсии. Часть полученных до 2012 г. сведений опубликована (Головатин, Пасхальный, 2000, 2013; Головатин и др., 2009). В настоящей статье описаны некоторые интересные, на наш взгляд, встречи птиц в сезоны 2013–2017 и 2019 гг.

Гуменник *Anser fabalis* гнездится вне поймы Нижней Оби — на материковой части. В пойме встречается только во время пролета. В гнездовое время в пойму, главным образом на краевые участки, иногда вылетают кормиться отдельные птицы, пары и небольшие стайки холостых птиц. Однако из-за сильного снижения численности

таежной популяции встречи их стали особенно редкими. Одиночная, летящая транзитом на большой высоте, птица отмечена 8 июля 2017 г. в окрестностях пос. Халаспатор на протоке Кривая Обь (66°44' с.ш., 67°55' в.д.). У южной границы округа (64°34' с.ш., 65°36' в.д.) на небольшой безымянной протоке 1 июля 2019 г. вспугнута одиночная птица.

Серая утка *Anas strepera*. В дельте Оби на о-ве Лебендиг (66°41' с.ш., 70°55' в.д.) 11 июля 2019 г. в сору, среди уток, готовящихся к линьке, отмечены 2 птицы.

Степной лунь *Circus macrourus*. В 2009 г. при обилии мышевидных грызунов в пойме Нижней Оби выше Салехарда превосходил по численности полевого луня *C. cyaneus* (Головатин и др., 2009). В последующие годы встречены отдельные птицы. Так, 29 июня 2014 г. в окрестностях д. Нов. Киеват (65°10' с.ш., 64°50' в.д.) видели самца, охотящегося среди разреженного ивняка на берегу р. Мал. Обь, 5 июля 2016 г. в том же районе на протоке Унсормас (65°10' с.ш., 64°46' в.д.) — самку, а 11 июля 2019 г. в дельте на гриве в сору на о-ве Лебендиг (66°43' с.ш., 70°21' в.д.) — самца.

Кречет *Falco rusticolus*. Одиночная птица 11 июля 2019 г. сидела на кустах ольховника на берегу о-ва Халейнго

(66°44' с.ш., 70°17' в.д.) в дельте Оби. Потревоженная, она улетела.

Тетерев *Lyrurus tetrix*. Самец встречен в окрестностях с. Азовы на лесном острове Ун-Пугор (64°50' с.ш., 64°05' в.д.) 4 июля 2016 г. Растительность на острове представляет собой кедровое редколесье с багульниковым, ерником в нижнем ярусе, в сочетании с участками травянистых топких моховых болот. Птица подпустила на 10 м, перелетела на 150 м и затем была снова поднята.

Рябчик *Tetrastes bonasia*. В лиственнично-кедрово-багульниковом лесу на правом коренном берегу реки в окрестностях д. Хошгорт (65°33' с.ш., 65°40' в.д.) 1 июля 2016 г. встречены 3 птицы, одна из них — самка с поршком.

Погоныш *Porzana porzana*. Изредка отмечался в Двубоье выше с. Шурышкар (Пасхальный, Головатин, 2000). В 1960-х гг. был обычен (Данилов, 1965). В дельте на о-ве Лебендиг (66°41' с.ш., 70°26' в.д.), в заливном сору, заросшем осокой, арктофилой и водной растительностью, с узкой сухой гривкой и единичной ивой (прил. 1) 11 июля 2019 г. встречена токующая птица, которая держалась на одном месте. Вспугнутая, она перелетала с места на место и продолжала токовать. Вполне вероятно, гнездилась.

Дупель *Gallinago media*. Очень редкий в пойме Оби вид, несмотря на то, что ее обширные водно-болотные угодья, казалось бы, являются подходящим для него местообитанием. За обозначенный период (после 2012 г.) встречен один раз: 29 июня 2014 г. на границе паркового ивняка и луга с озером в окрестностях д. Нов. Киеват вспугнули одиночную особь.

Большой кроншнеп *Numenius arquata*. Редкий, гнездящийся южнее условной линии с. Мужы — с. Горки, вид. Ежегодно, начиная с 2012 г. (см.: Головатин, Пасхальный, 2013), пара птиц отмечается в окрестностях с. Азовы на о-ве Ун Пугор (64°50' с.ш., 65°05' в.д.), где они держатся (токут и беспокоятся) на обширном топком травянистом болоте посреди останца, поросшего кедровым редколесьем. Одиночный кроншнеп пролетел 5 июля 2015 г. в окрестностях

д. Мальчигорт (64°34' с.ш., 65°16' в.д.) — там, где в 2012 г. наблюдали беспокоящуюся птицу (Головатин, Пасхальный, 2013). Еще одну особь в полете видели 5 июля 2016 г. в окрестностях д. Нов. Киеват (65°10' с.ш., 64°46' в.д.).

Большой веретенник *Limosa limosa*. Немногочисленный гнездящийся вид Двубоья. В 3-й декаде июля 2012 г. на крупных протоках внутренней части Двубоья (протоки — Кельчиас, Уйтас) в большом количестве отмечены стаи из 5–300 птиц, кормившихся на береговых отмелях (Головатин, Пасхальный, 2013). В последующие годы таких скоплений веретенников не отмечали, обычно — редкие группы до 20 особей. В начале июля 2019 г. в южной части Двубоья вновь наблюдали крупные скопления птиц (до 70 особей), которые активно летели с севера на юг и юго-запад, останавливались на обнажающихся косах, в сорах на мелководьях, по берегам протоков (прил. 2). Принимая во внимание общее большое число птиц, значительно большее, чем местных, видимо, это были особи из южных частей ареала.

Длиннохвостый поморник *Stercorarius longicaudus*. На тундровых островах в дельте (66°46' с.ш., 71°05' в.д.) был обычен в 2013 г., регулярно отмечали сидящих и охотящихся птиц и группы до 3 особей, 1 июля найдено гнездо с 1 яйцом, которое располагалось на небольшом бугорке среди кочкарной осоково-пушицево-моховой тундры (прил. 3) и представляло собой ямку во мху глубиной 6 см. Птица активно беспокоилась.

Полярная крачка *Sterna paradisaea*. В 2012 г. найдена на гнездовании в заполярной части поймы в окрестностях с. Аксарка (Головатин, Пасхальный, 2013). В 2013 г. в разных частях дельты отмечали беспокоящихся птиц. На о-ве Ермак (66°46' с.ш., 71°05' в.д.) во влажной пушицево-осоково-моховой тундре 1 июля обнаружена колония из 7 пар. Гнезда представляли собой ямки во мху на небольших (около 5 см) возвышениях, со слабой выстилкой из сухих листьев и веточек багульника (прил. 4), минимальное расстояние между ними составляло 5 м.

В гнездах было по 1–2 яйца. Птицы активно беспокоились, атакуя.

Филин *Bubo bubo*. Встречен 1 июля 2017 г. в окрестностях с. Азовы на облесенном о-ве Ун Пугор (64°50' с.ш., 65°05' в.д.) — останце, поросшем кедровым редколесьем в сочетании с участками травянисто-моховых топких болот. Птица вылетела в 10 м от наблюдателя и перелетела на дерево (прил. 5).

Сибирский конёк *Anthus gustavi*. Встречен в 2013 г. в разных частях дельты. Так, 26 июня 2 территориальных самца пели в окрестностях с. Панаевск на о-ве Лебедиги (66°43' с.ш., 70°26' в.д.), 2 июля — поющий самец на о-ве Ермак на побережье Обской губы (66°50' с.ш., 71°30' в.д.), 3 июля — поющий и беспокоящийся самец на протоке Юва (66°43' с.ш., 71°09' в.д.). Местообитание характерное: сырой низкотравный мелкопочечный луг с редким низким ивняком нижнего уровня поймы (прил. 6). Год был маловодным, и большая часть низких мест была не затоплена. В другие годы эти места были залиты водой.

Садовая камышовка *Acrocephalus dumetorum*. Активно поющий самец держался 2 июля 2019 г. в высоких (1.5–2.5 м) кустах на берегу сора и опушке березового леса в окрестностях д. Мальчигорт (64°33' с.ш., 65°13' в.д.).

Чернозобый дрозд *Turdus atrogularis*. В центральной части поймы ранее отмечен не был, приводится как гнездящийся вид коренного берега, в частности Войкарского сора (Головатин, Пасхальный, 2000). В 2015 г. поющий самец был встречен 8 июля в березово-кедрово-еловом лесу на острове-останце Шомапугор в окрестностях д. Усть Войкары (65°41' с.ш., 64°48' в.д.). В 2017 г. на останце Ун Пугор (64°50' с.ш., 65°05' в.д.) в окрестностях с. Азовы 1 июля встречен самец, кормящийся на моховом болоте посреди кедрового редколесья.

Работа выполнена в рамках гос. задания Института экологии растений и животных УрО РАН и при поддержке Программы Президиума УрО РАН (проект № 18-9-4-22).

ЛИТЕРАТУРА

- Головатин М. Г., Пасхальный С. П. Орнитофауна поймы Нижней Оби // Науч. вестн. Ямало-Ненец. авт. округа. 2000. Вып. 4, ч. 1. С. 18–37.
- Головатин М. Г., Пасхальный С. П. Некоторые аспекты орнитофауны поймы Нижней Оби в необычно маловодный 2012 год // Рус. орнитол. журн. 2013. № 883. С. 1432–1440.
- Головатин М. Г., Пасхальный С. П., Мейснер В.

Интересные встречи птиц в пойме Нижней Оби в сезон 2009 г. // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2009. Вып. 14. С. 21–23.

Данилов Н. Н. Птицы Нижней Оби и изменения в их распространении за последние десятилетия // Экология позвоночных животных Крайнего Севера. Свердловск, 1965. С. 103–109.

Приложение 1. Местообитание погоныша в дельте Оби, 11 июля 2019 г.

Appendix 1. A Spotted Crake habitat in the River Ob delta, 11 July 2019.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2019_2_FUS_gol1_a01.pdf

Приложение 2. Большие веретенники в сору в окрестностях с. Азовы, 3 июля 2019 г.

Appendix 2. Black-tailed Godwits on an overflow lake near Azovy village, 3 July 2019.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2019_2_FUS_gol1_a02.pdf

Приложение 3. Гнездо длиннохвостого поморника на тундровом острове в дельте Оби, 1 июля 2013 г.

Appendix 3. A Long-tailed Jaeger nest on a tundra island in the River Ob delta, 1 July 2013.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2019_2_FUS_gol1_a03.pdf

Приложение 4. Полярная крачка на гнезде и ее кладка на тундровом острове в дельте Оби, 1 июля 2013 г.

Appendix 4. Arctic Tern on the nest with a clutch on a tundra island in the River Ob delta, 1 July 2013.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2019_2_FUS_gol1_a04.pdf

Приложение 5. Филин в окрестностях с. Азовы, 1 июля 2017 г.

Appendix 5. Eagle Owl near Azovy village, 1 July 2017.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2019_2_FUS_gol1_a05.pdf

Приложение 6. Характерное местообитание сибирского конька в дельте Оби, 2 июля 2013 г.

Appendix 6. A typical Pechora Pipit habitat in the River Ob delta, 2 July 2013.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2019_2_FUS_gol1_a06.pdf

Interesting bird records in the Lower Ob floodplain (the Yamal-Nenets autonomous district)

M. G. Golovatin, V. A. Sokolov



Mikhail G. Golovatin, Vasily A. Sokolov, Institute of Plant and Animal Ecology, Ural branch of the Russian Academy of Sciences, 202, 8 Marta st., Ekaterinburg, Russia, 620144; golovatin@ipae.uran.ru; sokol@ipae.uran.ru

We report records of interesting (rare, non-typical, etc.) bird species in the floodplain of the Lower Ob (within the borders of the Yamal-Nenets autonomous district) in the period 2013–2017 and 2019 (the data collected before this period have already been published). We observed the following species: **Bean Goose** *Anser fabalis*, **Gadwall** *Anas strepera*, **Pallid Harrier** *Circus macrourus*, **Gyr Falcon** *Falco rusticolus*, **Black Grouse** *Lirurus tetrix*, **Hazel Grouse** *Tetrastes bonasia*, **Spotted Crake** *Porzana porzana*, **Great Snipe** *Gallinago media*, **Eurasian Curlew** *Numenius arquata*, **Black-tailed Godwit** *Limosa limosa*, **Long-tailed Skua** *Stercorarius longicaudus*, **Arctic Tern** *Sterna paradisaea*, **Eagle Owl** *Bubo bubo*, **Pechora Pipit** *Anthus gustavi*, **Blyth's Reed Warbler** *Acrocephalus dumetorum*, **Black-throated Thrush** *Turdus atrogularis*.

Key words: avifauna, distribution, biodiversity.

The study was implemented for the state contract of the Institute of Plant and Animal Ecology of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences (UBRAS) with support from the program of the UBRAS Presidium (project no. 18-9-4-22).

REFERENCES

- Danilov N. N. Birds of the Lower Ob and changes in their distribution over the last decades, in *Ekologiya pozvonochnykh zhivotnykh Kraynego Severa*, 1965, no. 38, pp. 103–109.
- Golovatin M. G., Paskhalniy S. P. Avifauna of the floodplain of the Lower Ob, in *Nauchnyi vestnik Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga*, 2000, no. 4, pt. 1, pp. 18–37.
- Golovatin M. G., Paskhalniy S. P. Some aspects of the avifauna of the Lower Ob floodplain in the unusually dry year of 2012, in *The Russian J. of Ornithology*, 2013, no. 883, pp. 1432–1440.
- Golovatin M. G., Paskhalniy S. P., Meyssner V. Interesting bird records in the Lower Ob floodplain in the 2009 season, in *Materialy k rasprostraneniyu ptits na Urale, v Priuralye i Zapadnoy Sibiri*, 2009, no. 14, pp. 21–23.